

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФГУН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЛЦ, директор ФГУН
«ЦНИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, академик РАМН,
профессор

Покровский В.И.

«27» декабря 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПО «ВЕЛТ», к.м.н.

Иванова Е.Б.

«27» декабря 2006 г.

Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.36.2.У.14303.12.06 от 26.12.2006 г.

№ 016-19/06-И

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
дезинфицирующего средства –
кожного антисептика «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)**

Москва, 2006 г.

УДК 614.484 (083.131)

ББК 51.9я82

И72

Инструкция по применению дезинфицирующего средства – кожного антисептика «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП» (ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия). М.: ООО «Издательский дом «ВЕЛТ», 2010 г. – 12 с.

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в т. ч. акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи и т. д.), соответствующих подразделений МЧС, а также работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ИНСТРУКЦИЯ № 016-19/06-И
по применению дезинфицирующего средства –
кожного антисептика «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Исследования проведены и подтверждены научными отчетами в следующих учреждениях:

- ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора);
- ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» (ООО «НПО «ВЕЛТ»);
- ФГУ РНИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Росздрава (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена Росздрава).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП» представляет собой прозрачный раствор синего цвета, готовый к применению. В качестве действующего вещества содержит клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом и изопропиловый спирт ($70 \pm 3,0$ %), а также функциональные и технологические компоненты (краситель и вода).

1.2. Срок годности средства составляет 5 лет. Хранить средство следует в закрытой упаковке производителя в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от -10 °С до $+40$ °С.

1.3. Средство «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП» транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

1.4. Выпускается в полиэтиленовых бутылках вместимостью 0,1; 0,25; 0,4; 0,5 и 1 дм³ или другой приемлемой для потребителя таре по действующей нормативной документации.

1.5. Средство «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий

(включая возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т. ч. возбудителей гриппа и др. острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита).

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.

1.6. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП» относится к 4 классу малоопасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. Средство не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием.

По степени летучести средство малоопасно.

1.7. Средство предназначено для обработки кожи операционного поля, перед введением катетеров и пункцией суставов, инъекционного поля, локтевых сгибов доноров.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП»

2.1. При обработке операционного поля, перед введением катетеров и пункцией суставов или локтевых сгибов донора кожу последовательно *двукратно* протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки — 2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.2. При обработке инъекционного поля кожу протирают (*в одном направлении*) стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 мин.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Используют только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3. Избегать попадания средства в глаза!

3.4. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не курить!

3.5. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше +40 °С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

3.6. По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.7. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При попадании средства «ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП» в глаза немедленно промыть их под струёй воды и закапать 30 % раствор сульфацила натрия (альбуцида), в случае необходимости обратиться к врачу.

4.2. При попадании средства в желудок – промыть желудок большим количеством воды, затем дать адсорбент (10–20 таблеток активированного угля).